

Hypospadias (TIP Repair) کے بعد کی احتیاط

عام طور پر اس آپریشن کے بعد مریض بغیر کسی پچیدگی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ضروری احتیاط ابھی بتائی جا رہی ہے

پٹی کی احتیاط

• اس آپریشن کے بعد جو پٹی کی گئی ہے وہ کئی تہوں میں ہے۔ سب سے نیچے ایک پلاسٹک کی پٹی ہے جو زخم کے گرد لپیٹی ہی ہے۔ اس کے اوپر ایک سفید رنگ کی پٹی لپیٹی ہوئی ہے۔ اور پھر دو تہیں پلاسٹک کی پٹی کی ہیں۔ آپریشن کے بعد نیچے والی پٹی تھوڑا خون رنسنے کی وجہ سے سرخ ہو سکتی ہے جو کہ پریشانی کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ پریشن کے بعد پٹی آپ کو اس طرح نظر آئے گی۔



• یہ پٹی نیچے کی روزمرہ کی حرکت کے ساتھ خود ہی گرفتار جائے گی۔ یہ پٹی گرفتار کرنے کے بعد دوبارہ پٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات پٹی پوری نہیں گرتی اور زخم کے کسی حصے سے چپکی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں نیچے کو اچھی طرح نہلاکیں اور احتیاط سے یہ پٹی گھر پر ہی اتار لیں۔

• چھوٹے بچوں میں جو کہ ڈاپر لگاتے ہیں، کئی مرتبہ پاخانہ پٹی پر لگ جاتا ہے یا پٹی کے اندر جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے گیلے کپڑے سے صاف کر لیں اور پٹی اترنے کا انتظار کریں۔

• اگر آپریشن کے ایک ہفتہ تک پٹی نہ اترے تو نیچے کو پانی کے ٹب میں اچھی طرح بٹھائیں اور تقریباً ۳۰ منٹ تک زخم والی جگہ کو ڈبوایا رہنے دیں۔ اس کے بعد پٹی بالکل نرم ہو جائے گی اور آپ اس کو احتیاط سے اتار سکتے ہیں۔

• پٹی اترنے کے بعد آپریشن والی جگہ پر سوزش نظر آتی ہے جو کہ والدین کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ سوزش ختم ہونے میں کئی ماہ تک لگ سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔

پٹی اترنے کے بعد زخم پر کوئی قد غن اکریم لگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ پولی فیکس کریم اس جگہ پر گا سکتے ہیں تاکہ یہ جگہ ڈاپر کے ساتھ نہ چپکے۔

پیشاب کی نالی (Catheter)

نالی کتنے دن رہے گی۔ یہ بات آپ کو ڈاکٹر ہی بتائیں گے۔ کیونکہ کچھ بچوں میں یہ نالی دن رکھی جاتی ہے جبکہ کچھ میں 14 دن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔



- عام طور پر نالی کے آگے ایک بیگ لگا ہوتا ہے جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ آپ وقت نفوتا یہ بیگ خالی کرتے رہیں۔ آپ اس بیگ کو اتار سکتے ہیں اور ڈائریکٹ نالی کو ڈاپر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تاکہ جو بھی پیشاب باہر آئے وہ سیدھا ڈاپر میں جائے۔
- یہ نالی ایک دھاگے کے ذریعے جسم کے ساتھ باندھی گئی ہے۔ اگر وقت مقررہ سے پہلے نالی نکل آئے اور بچہ پیشاب کرتا رہے تو ہم نالی دوبارا نہیں ڈالتے۔ لیکن اگر نالی حادثاتی طور پر گھر میں نکل آئے اور بچے کو پیشاب نہ آ رہا ہوں یا پیشاب میں پریشانی ہو رہی ہو تو فوراً ہسپتال آئیں کہ ایسی صورت میں دوبارہ نالی ڈالنی پڑھ سکتی ہے۔



- اگر یہ نالی جسم سے باہر آ جائے اور صرف دھاگے کے ساتھ چکی ہو تو آپ گھر میں قینچی سے یہ دھاگہ کاٹ کر نالی ہٹا سکتے ہیں۔
- اگر نالی کی وجہ سے آپریشن کی جگہ میں کوئی کھینچ آ رہی ہوں اور دکھائی دے کہ اس کی وجہ سے بچہ درد میں ہے تو آپ پولی فیکس کریم نالی پر لگائیں اور آہستہ سے نالی کو اندر کر دیں تاکہ ٹانکے پر اب مزید کھچاؤ نہ ہو۔
- عام طور پر یہ نکلی ہم خود بلا کر اتارتے ہیں سو آپ کو جو بھی تاریخ دی جائے اس پر آکر یہ نکلی اتروائیں۔

کب نہلا میں

آپریشن کے ۲۸ گھنٹے بعد بچے کو نہلا یا جاسکتا ہے بڑی عمر کے لڑکے اور مرد شاور کے نیچے کھڑے ہو اور مکمل طور پر نہائیں۔ نہاتے ہوئے پٹی گلی ہو گی اور کچھ پانی نکلی میں بھی جاسکتا ہے جو کہ مکمل طور پر نارمل ہے۔ نکلی نکلنے کے بعد دن میں دو مرتبہ نہانا ضروری ہے جو کہ صفائی رکھنے کے کام آتا ہے اور اس سونج بھی کم کرتا ہے۔

دوا میں

آپریشن کے بعد پہلے دو سے تین درد زیادہ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر پیناڈول اور بروفن کا سیر پ استعمال کرتے ہیں۔ پیناڈال سیر پ دن میں چار مرتبہ ہر چھ گھنٹے بعد (جیسا کہ صبح چھ بجے، دوپہر بارہ بجے، شام چھ بجے، رات بارہ بجے) دیں۔ اگر درد زیادہ ہو تو بروفن سیر پ بھی ساتھ دے سکتے ہیں مگر اس کا ٹائم تین گھنٹے کے بعد ہو گا (جیسا کہ صبح 9 بجے، شام دوپہر 3 نج، شام نوبجے، رات تین بجے) تاکہ بچے کو ہر تین گھنٹے بعد ایک درد کی دوام جائے۔

بڑے بچوں اور مردوں میں بھی اسی طرح پیناڈال اور بروفن دی جاتی ہے مگر ان میں ہم کچھ اور دوائیں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ بڑے بچوں اور مردوں میں نالی کی وجہ سے مثانہ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور انہیں نفس کے پاس درد بھی ہو سکتا ہے جس کی دوائی بھی انہیں دی جاتی ہے۔

اگر کسی دوائی کی وجہ سے بچے کو قبض محسوس ہو تو آپ بچے کو پانی فروٹ اور سبزی کا استعمال زیادہ کر دیں۔ اگر اس سے بھی قبض ٹھیک نہ ہو تو قبض کشاد والی دے سکتے ہیں۔ آپریشن کے بعد انیٹی بائیو ٹکس دی جاتی ہے جو کہ نکلی اترنے کے بعد عام طور پر بند کر دی جاتی ہے۔

ٹانکے

اگرچہ اس آپریشن میں بہت سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں مگر وہ سب خود بخود جذب ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ٹانکہ جس کے ذریعے نالی نفس کے ساتھ گلی ہوتی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

بخار

آپریشن کے بعد پہلی رات بخار ہو سکتا ہے جو کہ نارمل ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپریشن کے کچھ دن بعد بخار، چڑچڑاپن، کان یا گلے کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فوری ڈاکٹر کو دکھائیں۔

کبھی کبھار آپ یشن کے بعد ٹانکے ٹوٹ کر کھل جاتے ہیں اور یہ نفس کے اگلے حصے پر ہو سکتا ہے۔ اگر جلد سرخ ہو جائے یا چھونے پر گرم محسوس ہوا اور درد میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ ٹانکے کھلنے کی صورت میں پانی کے ٹب میں تیس منٹ کے لئے روزانہ دو مرتبہ بچ کو بٹھایا اور زخم پر پولی فیکس لگانا شروع کر دیں۔ عام طور پر یہ زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سرگرمیاں (Activities)

عام طور پر ہم بچوں کو سرگرمیاں محدود کرنے کا نہیں کہتے۔ تاہم کھلونے جیسا کہ جپر (Jumper)، سائیکل چلانے سے پرہیز کروائیں۔ مردوں کو دو ہفتے تک تیراکی، فٹبال، بھاری بھر کم کام یا یہ کھیلوں سے احتیاط کرنی ہے۔

ہنگامی صورتحال (Emergency)

اس آپ یشن کے بعد ہنگامی صورتحال (Emergency) ہونے کے خدشات بہت کم ہیں اور زیادہ تر حالات میں آپ کلینک کے ٹائم (شام چار بجے سے آٹھ بجے کے دوران) فون کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایمیر جنسی صورتحال ہو یا فوری مسئلہ ہو تو بچے کو لے کر ہسپتال کسی بھی وقت آسکتے ہیں۔

اس آپ یشن کے بعد کسی بھی مسئلے کیلئے ایمیر جنسی میں موجود ڈاکٹر کے پاس یا کسی اور کلینک پر مت جائیں۔ عام طور پر ایمیر جنسی میں موجود ڈاکٹر اس یہاری اور اس کی احتیاط کو نہیں جانتے ہوتے اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے مشورہ کئے بغیر کوئی ڈاکٹر اس جگہ کو چھوئے۔ سوا گر کوئی بھی ایمیر جنسی صورتحال ہو تو کسی بھی وقت اسی ہسپتال آ جائیں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر 03343307728 پر تصویر بھیجیں اور ہم سے رابطہ کریں۔