

Undescended Testis Surgery کے بعد کی احتیاطات

عام طور پر اس آپریشن کے بعد مریض بغیر کسی پچیدگی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ضروری احتیاط ابھی بتائی جا رہی ہے۔

پئی کی احتیاطات

اس آپریشن کے بعد دو ٹپیاں کی گئی ہیں اور وہ سادہ سی پئی ہے۔ یہ پئی ہر دوسرے دن تبدیل کریں۔ زخم کو سپرت سے صاف کریں اور گھر پر خود ہی پئی تبدیل کریں۔ ہم اس کے لیے Post-op Opsite Dressing تجویز کرتے ہیں جو ہر فارمیسی سے مل جاتی ہے۔

کب نہ لائیں

عام طور پر آپریشن کے پانچ یا چھ دن بعد بچے کو نہ لایا جا سکتا ہے۔

دوائیں

آپریشن کے بعد پہلے دو سے تین دروز یا دو ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر بیناڈول اور بروفن کا سیر پ استعمال کرتے ہیں۔ بیناڈال سیر پ دن میں چار مرتبہ ہر چھ گھنٹے بعد (جیسا کہ صبح بجے، دوپہر بارہ بجے، شام چھ بجے، رات بارہ بجے) دیں۔ اگر دروز یا دو ہو تو بروفن سیر پ بھی ساتھ دے سکتے ہیں مگر اس کا نامم تین گھنٹے کے بعد ہو گا (جیسا کہ صبح 9 بجے، شام دوپہر 3 نج، شام نوبجے، رات تین بجے) تاکہ بچے کو ہر تین گھنٹے بعد ایک درد کی دوامل جائے۔

اگر کسی دوائی کی وجہ سے بچے کو قبض محسوس ہو تو آپ بچے کو پانی فروٹ اور سبزی کا استعمال زیادہ کر دیں۔ اگر اس سے بھی قبض ٹھیک نہ ہو تو قبض کشا دوائی دے سکتے ہیں۔

اس آپریشن کے بعد انیٹی بائیو ٹکس نہیں دی جاتی۔

ٹالکے

اگرچہ اس آپریشن میں بہت سے ٹالکے لگاتے ہیں مگر وہ سب خود بخود جذب ہو جاتے ہیں۔ اور ٹالکے نکلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

بخار

آپریشن کے بعد پہلی رات بخار ہو سکتا ہے جو کہ نارمل ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپریشن کے کچھ دن بعد بخار، چڑیاپن، کان یا لگلے کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فوری ڈاکٹر کو دکھائیں۔

سر گرمیاں (Activities)

عام طور پر ہم بچوں کو سر گرمیاں محدود کرنے کا نہیں کہتے۔ تاہم کھلونے جیسا کہ جپر (Jumper)، سائیکل چلانے سے پرہیز کروائیں۔ اور یہ احتیاط آپریشن کے تین ہفتے تک ضروری ہے۔

برگایی صورتحال (Emergency)

اس آپریشن کے بعد ہنگامی صورتحال (Emergency) ہونے کے خدشات بہت کم ہیں اور زیادہ تر حالات میں آپ ملینک کے ٹائم (شام چار بجے سے آٹھ بجے کے دوران) فون کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایمر جنسی صورتحال ہو یا فوری مسئلہ ہو تو بچے کو لے کر ہسپتال کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔

Dr. Naeem Liaqat